

CERTO®

HRAVO SI PORADÍ S BURINAMI V OBILNINÁCH AJ KUKURICI

- UNIVERZÁLNY, OSVEDČENÝ A SPOĽAHLIVÝ HERBICÍD DO OBILNÍN A KUKURICE
- OBSAHUJE DVE ÚČINNÉ LÁTKY S ROZDIELNYM MECHANIZMOM PÔSOBENIA
- OKAMŽITÝ ÚČINOK PROTI DVOJKLÍČNOLISTOVÝM BURINÁM

Herbicíd určený na likvidáciu odolných dvojklíčnolistových burín v ozimných a jarných obilninách a kukurici.

Účinná látka: 250 g/kg tritosulfuron, 500 g/kg dicamba

Prípravok CERTO je kombinovaný systémový herbicíd prijímaný predovšetkým listami, čiastočne aj cez korene burín. V pôde sa účinné látky prípravku CERTO odbúravaju veľmi rýchle. Po jeho použití sa nemení pôdna mikroflóra, ani jej biologická aktivita.

Účinok sa prejaví po 3-5 dňoch zastavením rastu a buriny už v tomto štádiu prestávajú konkurovať plodine. Buriny postupne žltnú, v priebehu 2-3 týždňov úplne hynú. Účinok urýchľuje teplé a vlhké počasie.

Citlivé buriny: rumančeky, rumany, lipkavec obyčajný, pichliač roľný, mak vlčí, horčica roľná, kapsička pastierska, mrlíky, hluchavky, veroniky.

Odolné buriny: stavikrv vtáčí, fialka roľná a všetky trávovité buriny.

Návod na použitie

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	Ochranná doba	Poznámka
pšenica ozimná, tritikale	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,2 kg	AT	
		0,2 kg + (0,1 l)	AT	(TM) Spartan
jačmeň jarný	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,15 kg	AT	
		0,15 kg + (0,1l)	AT	(TM) Spartan
jačmeň ozimný, ovos siaty, raž ozimná	dvojklíčnolistové buriny, lipkavec	0,2 kg	AT	
		0,2 kg + (0,1 l)	AT	(TM) Spartan
kukurica	dvojklíčnolistové buriny	0,2 kg	AT	
		0,2 kg + (0,1 l)	AT	(TM) Spartan
	dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, ježatka, pýr	0,2 kg + (1,0 – 1,5 l)		(TM) Nisshin 4 SC

Ďalšie výhody použitia

- Komplexné riešenie dôležitých dvojklíčnolistových burín v obilninách aj kukurici
- Bezproblémová miešateľnosť s inými účinnými látkami
- Možný tank-mix aj s tekutým dusíkatým hnojivom typu DAM 390
- Bez negatívneho vplyvu na následné plodiny
- Výhodný pomer ceny a účinku

Odporúčania pre aplikáciu

Obilniny

Postrekuje sa v štádiu 2-6 listov burín (BBCH 12-16). Pri aplikácii na jar je najvýhodnejšie, keď sú ozimné obilniny v čase aplikácie v rastovej fáze od troch listov až do konca odnožovania (BBCH 13-29) jarné obilniny v rastovej fáze od 3 listov až do plného odnožovania (BBCH 13-25).

Kukurica

Optimálny aplikačný termín je v rastovej fáze 3 až 8 listov (BBCH 13-18). Pri súčasnom výskyte trávovitých burín sa odporúča tank-mix kombinácia s prípravkom Nisshin 4 SC.

**VYUŽITE NÁKUP CERTO®
PROSTREDNÍCTVOM
CENOVU ZVÝHODNENÝCH
BALÍČKOV, PRI KTORÝCH
UŠETRÍTE**



**zľava
5%**

**BALÍČEK NA 25 ha Certo 5 kg
Impulse Gold 15 l**



**zľava
21%**

**BALÍČEK NA 20 ha Nisshin 4 SC 30 l, Certo 4 kg
Spartan 2 l**



Ing. Adrián Janík
obchodný zástupca - západ
+421 917 495 638
adrian.janik@sumiagro.sk

Ing. Ján Cvopa
obchodný zástupca - stred, sever
+421 903 278 160
jan.cvopa@sumiagro.sk

Ing. Dušan Konček
obchodný zástupca - východ
+421 907 941 378
dusan.koncek@sumiagro.sk

Ing. Ján Murín
obchodný zástupca - juh
+421 905 411 561
jan.murin@sumiagro.sk

Ing. Andrej Abrahám
obchodný a marketingový riaditeľ
+421 917 238 517
andrej.abraham@sumiagro.sk